

# AIGLE ROYAL / GOLDEN EAGLE

Accipitridés - *Aquila chrysaetos*

Statut Conservation CITES : Annexe II



OBSERVABLE  
EN FRANCE

## STATUT UICN :



LONGÉVITÉ / LIFESPAN : 40 ans


POIDS / WEIGHT : 3kg à 6kg

ENVERGURE / WINGSPAN :




## RÉGIME ALIMENTAIRE / DIET

Mammifères, oiseaux, charognes, reptiles, petits carnivores et oiseaux



## RÉPARTITION / DISTRIBUTION



■ Présence annuel / Annual area  
■ Aire de reproduction / Reproduction Area

## MODE DE VIE / LIFESTYLE

Super Prédateur. Tout mammifère de taille moyenne vivant sur son territoire est susceptible d'être capturé. Principalement sédentaire.

*Super Predator. Any medium-sized mammal living in its territory is potentially captured. Mainly sedentary.*

## BIOTOPE / BIOTOPE

Tous les milieux ouverts, jusqu'à 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya... En France vous pouvez l'observer dans les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées.

*All open areas, up to 5000m in the Himalayas... In France you can observe it in the Alps and the Massif Central*

## REPRODUCTION / REPRODUCTION

Construit plusieurs aires de branchages à flanc de falaise ou dans un arbre. Une seule sera occupée. Sur 1 à 3 oeuf pondus, couvés 42 jours. Le plus souvent 1 aiglon prendra son envol.

*Builds several nest on the side of a cliff, only one will be occupied. From 1 to 3 eggs incubated for about 42 days. Only 1 young from the nest will fledge.*





**OBSERVABLE  
EN FRANCE**

# AIGLE BOTTE / *BOOTED EAGLE*

*Accipitridés - Hieraaetus pennatus*

Statut Conservation CITES : Annexe II



## STATUT UICN :



**LONGÉVITÉ / LONGEVITY :** 20 ans


**POIDS / WEIGHT :** 850gr à 1250gr

**ENVERGURE / WINGSPAN :**



## RÉGIME ALIMENTAIRE / DIET

Petits mammifères  
et oiseaux



## RÉPARTITION / DISTRIBUTION



Aire d'hivernage / Wintering area  
 Aire de reproduction / Reproduction Area

## MODE DE VIE / LIFESTYLE

Petit Aigle discret mais habile chasseur. Les populations méridionale sont sédentaires et les populations septentrionales sont migratrices.

*A small, discreet but skilful hunter. The southern populations are sedentary and the northern populations are migratory.*

## BIOTOPE / BIOTOPE

Massif forestiers, de la plaine jusqu'à la moyenne montagne. Vallées et ravins boisés des régions sèches autour de la méditerranée.


*Forest from grassland to the middle mountains. Wooded valleys and ravines in the dry regions around the Mediterranean sea.*

## REPRODUCTION / REPRODUCTION

L'aigle botté construit son nid à la cime d'un grand arbre. Il y pondra 2 à 3 œufs dont la durée d'incubation est d'environ 34 jours.

*The booted eagle builds its nest in the top of a large tree. It will lay 2 to 3 eggs incubated for about 34 days.*





**OBSERVABLE  
EN FRANCE**



# MILAN NOIR / BLACK KITE

*Accipitridés - Milvus migrans*

Statut Conservation CITES : Annexe II

## STATUT UICN :



Éteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

**LONGÉVITÉ / LIFESPAN :** 15 ans


**POIDS / WEIGHT :** 550 gr à 1100 gr

**ENVERGURE / WINGSPAN :**



## RÉGIME ALIMENTAIRE / DIET :

Insectes, charognes, petits mammifères et oiseaux



## RÉPARTITION / DISTRIBUTION



- Sédentaire / Annual area
- Aire d'hivernage / Wintering area
- Aire de reproduction / Reproduction Area

## MODE DE VIE / LIFESTYLE

Petit prédateur opportuniste, volontiers charognard, vol très élégant caractérisé par une grande manœuvrabilité. Capture habilement les grands insectes en vol.

*Small opportunistic predator, happy scavenger, very elegant flight, characterized by great maneuverability. Skillfully captures large insects in flight.*

## BIOTOPE / BIOTOPE

Il s'est remarquablement adapté aux modifications du milieu par les activités humaines et exploite tout milieu ouvert, des savanes aux marais jusqu'aux décharges péri-urbaines.

*Remarkably adapted itself to changes in the environment caused by human activities. And present in any open environment, from savannas to marshes to peri-urban dumps.*

## REPRODUCTION / REPRODUCTION

Construit son nid sur des sites naturels ou artificiels souvent à proximité des humains. 2 à 3 œufs pondus qui incuberont entre 26 et 38 jours.

*Builds its nest on natural or artificial sites often close to humans. 2 to 3 eggs laid incubated between 26 and 38 days.*



# VAUTOUR FAUVE / GRIFFON VULTURE

Accipitridés - *Gyps fulvus*

Statut Conservation CITES : Annexe II



OBSERVABLE  
EN FRANCE

## STATUT UICN :



LONGÉVITÉ / **LONGEVITY** : 35 ans

POIDS / **WEIGHT** : 6 kg à 11 kg

ENVERGURE / **WINGSPAN** :



RÉGIME ALIMENTAIRE / **DIET** :

Charognes.



## RÉPARTITION / DISTRIBUTION



- Présence annuelle / Annual area
- Aire d'hivernage / Wintering area
- Aire de reproduction / Reproduction Area

## MODE DE VIE / LIFESTYLE

C'est le vautour le plus symbolique des montagnes françaises. Son activité d'équarrisseur naturel permet de contrôler la diffusion des maladies contagieuses au sein de la faune sauvage et domestique.

*It is the most symbolic vulture of French mountains. Its activity as a scavenger helps to control the spread of contagious diseases to wild and domestic animals*

## BIOTOPE / BIOTOPE

Falaises abruptes pour la reproduction et étendues rocheuses avec ensoleillement important pour la formation d'ascendances thermiques. Exploration des milieux ouverts pour la recherche de nourriture.

*Steep cliffs and rocky expanses with plenty of sunshine for the formation of thermal lift. Exploration of open habitats for the search for food.*

## REPRODUCTION / REPRODUCTION

Colonies de plusieurs dizaines de couples à flanc de falaises. Un seul œuf pondu à la fin de l'hiver. Incubation de 2 mois. Le jeune prend son envol 4 mois plus tard

*Colonies of dozen of pairs on the side of cliffs. A single egg laid at the end of winter. 2 month incubation. The young takes flight 4 months later.*





**OBSERVABLE  
EN FRANCE**

# VAUTOUR MOINE / EURASIAN BLACK VULTURE

*Accipitridés - Aegypius monachus*

Statut Conservation CITES : Annexe II

## STATUT UICN :



Éteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

**LONGÉVITÉ / LONGEVITY :** 35 ans

**POIDS / WEIGHT :** 7 kg à 12 kg

**ENVERGURE / WINGSPAN :**



**RÉGIME ALIMENTAIRE / DIET :**

Charognes.



## RÉPARTITION / DISTRIBUTION



- Présence annuelle / Annual area
- Aire d'hivernage / Wintering area

## MODE DE VIE / LIFESTYLE

La puissance et le gabarit imposant de ce vautour noir lui permet de dominer les vautours fauves lors de la curée. Il parvient même à voler la proie d'un aigle !

*The power and the imposing size of this black vulture allows it to dominate the griffon vultures during the quarry. He even manages to steal an eagle's prey!*

## BIOTOPE / BIOTOPE

Reproduction dans les zones boisées des reliefs montagneux ensoleillés. Tous les milieux sont exploités pour la recherche alimentaire.

*Reproduction in wooded areas on the sunny side of mountains. All environments are exploited for food research.*

## REPRODUCTION / REPRODUCTION

Aire énorme édiflée au sommet d'un grand arbre. Nids isolés ou regroupés en noyaux de populations de faible effectif. 1 œuf pondu pour une durée d'incubation de 54 à 56 jours. Le jeune s'envolera à l'âge de 4 mois.

*Enormous nest built on top of a large tree. Nests isolated or grouped together in nuclei of small populations. 1 egg laid incubated for 54 to 56 days. The young will fly away at the age of 4 months.*



# HIBOU GRAND DUC EUROPÉEN / EURASIAN EAGLE OWL

Strigidés - *Bubo bubo*

Statut Conservation CITES : Annexe II



OBSERVABLE  
EN FRANCE

## STATUT UICN :

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Éteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

LONGÉVITÉ / *LIFESPAN* : 20 ans

POIDS / *WEIGHT* : 1.5kg à 4.2kg


ENVERGURE / *WINGSPAN* :



160- 180 cm

## RÉGIME ALIMENTAIRE / *DIET* :

Petits mammifères  
oiseaux, reptiles.



Espace  
Rambouillet

PARC FORESTIER ET ANIMALIER



## RÉPARTITION / *DISTRIBUTION*



Sédentaire / *Annual area*

## MODE DE VIE / *LIFESTYLE*

Oiseau très puissant. C'est un super prédateur qui régule la population des autres prédateurs présents sur son territoire.

*Very powerful bird. It is a super predator who regulates other predators population present in its territory.*

## BIOTOPE / *BIOTOPE*

Milieus forestiers montagneux ; pentes rocheuses, falaises boisées.

*Mountainous forest environments; rocky slopes, wooded cliffs.*

## REPRODUCTION / *REPRODUCTION*

En France, il niche essentiellement dans les anfractuosités des falaises où il dépose ses oeufs en fin d'hiver. 2 à 4 oeufs par pondus qui incuberont entre 34 et 36 jours

*In France, it mainly nests in the crevices of the cliffs where it lays its eggs at the end of winter. 2 to 4 eggs per laid incubated between 34 and 36 days*



OBSERVABLE  
EN FRANCE

# CHOUETTE HULOTTE / TAWNY OWL

Strigidés - *Strix aluco*

Statut Conservation CITES : Annexe II



## STATUT UICN :



LONGÉVITÉ / **LIFESPAN** : 15 ans


POIDS / **WEIGHT** : 330 gr à 695 gr

ENVERGURE / **WINGSPAN** :



## RÉGIME ALIMENTAIRE / **DIET** :

Insectes, petits mammifères et oiseaux



## RÉPARTITION / **DISTRIBUTION**



■ Sédentaire / Annual area

## MODE DE VIE / **LIFESTYLE**

Son ulullement nocturne est célèbre. Par ignorance et superstition, il a terrorisé nombre de nos ancêtres ! Mimétique et immobile, elle est aussi difficile à voir que facile à entendre.

*Its nocturnal ululation is famous. Out of ignorance and superstition, it terrorized many of our ancestors! Mimetic and immobile, it is as difficult to see as it is easy to hear.*

## BIOTOPE / **BIOTOPE**

Son habitat originel est la forêt de feuillus. Elle a su s'adapter aux milieux urbains. On la retrouve désormais depuis les banlieues jusqu'au centre des capitales.

*Its native habitat is hardwood forest. It has been able to adapt to urban environments, now it can be found in the suburbs to the center of capitals.*

## REPRODUCTION / **REPRODUCTION**

En France, reproduction dès la fin de l'hiver. 2 à 4 œufs couvés pendant 1 mois. Les petits quittent le nid avant de savoir voler mais seront encore nourris par leurs parents pendant près de 1 mois.





OBSERVABLE  
EN FRANCE



# CHOUETTE EFFRAIE / BARN OWL

Tytonidés - *Tyto alba*

Statut Conservation CITES : Annexe II

## STATUT UICN :



LONGÉVITÉ / **LIFESPAN** : 15 ans


POIDS / **WEIGHT** : 180 gr à 450 gr

ENVERGURE / **WINGSPAN** :




## RÉGIME ALIMENTAIRE / **DIET** :

Insectes, petits mammifères et oiseaux



## RÉPARTITION / **DISTRIBUTION**



■ Sédentaire / *Annual area*

## MODE DE VIE / **LIFESTYLE**

Population globalement sédentaire. L'Effraie chasse à l'affût depuis un perchoir mais elle aime explorer son territoire en volant silencieusement près du sol, ce qui l'expose de plus en plus fréquemment aux collisions avec les véhicules.

Generally sedentary population. The barn Owl hunts from a hide but likes to explore its territory by flying silently close to the ground, which exposes it more and more frequently to collisions by vehicles.

## BIOTOPE / **BIOTOPE**

Distribution cosmopolite. Elle évite les régions du globe aux hivers trop longs et rigoureux.

Tous types de milieux ouverts, naturels ou artificiels : steppes, landes, prairies, marais etc. Son goût pour les clochers des églises lui a valu son surnom d'effraie des clochers.

Its native habitat is hardwood forest. It has been able to adapt to urban environments, now it can be found in the suburbs to the center of capitals.

## REPRODUCTION / **REPRODUCTION**

Cavernicole, le nid est installé dans des cavités naturelles ou artificielles (grange greniers, clochers). 5 œufs pondus en moyenne, incubés 30 jours. Envol des jeunes à 55 jours.

